

Hémorragie digestive basse chez l'enfant

Qu'est-ce qu'une hémorragie digestive basse ?

Il y a fréquemment des hémorragies dans le gros intestin (le côlon) et le rectum. Les causes les plus courantes d'une émission de sang rouge vif par voie rectale sont :

- ◆ une irritation locale due à des coupures (fissures) ou à des hémorroïdes ;
- ◆ des polypes ;
- ◆ une infection (causée par des bactéries, par exemple, la bactérie *Campylobacter*, *Shigella*, *Salmonella* ou *E. coli*) ;
- ◆ une inflammation (par exemple, une colite ou la maladie de Crohn).

L'hémorragie peut se présenter sous forme de traînées ou de caillots de sang. Le sang peut être mélangé aux selles ou envelopper la matière fécale.

L'hémorragie digestive basse est-elle courante ?

Les pédiatres et les gastro-entérologues pédiatriques soignent assez régulièrement ce genre de cas. On estime que 1 % de toutes les hospitalisations pédiatriques est du à une hémorragie gastro-intestinale.



INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES :

Traitement d'une hémorragie digestive basse

Le traitement d'une hémorragie digestive basse dépend de la cause et de l'emplacement de l'hémorragie. Une colonoscopie est la meilleure façon de diagnostiquer la cause d'une hémorragie gastro-intestinale. Elle est recommandée en cas d'hémorragie grave ou lorsque le médecin soupçonne des polypes ou une colite. Dans ce test, on utilise un tube souple muni d'une minuscule caméra qui permet au médecin d'examiner en direct les muqueuses de l'intestin grêle.

Tout polype détecté peut être enlevé au cours de l'endoscopie à l'aide d'instruments spéciaux. On fait souvent une biopsie (le prélèvement d'un petit échantillon de tissu) pour diagnostiquer la cause de l'hémorragie afin de pouvoir la traiter.

Le traitement de fissures et d'hémorroïdes inclut une modification de régime, des laxatifs et des crèmes et baumes topiques.

[continué sur la page prochaine]

Hémorragie digestive continué

Qu'est-ce qui cause une hémorragie gastro-intestinale ?

Le fait de se forcer pour passer des selles dures ou larges risque de blesser l'anus et de causer une hémorragie. Dans le cas d'une colite, les muqueuses du côlon sont enflammées et saignent facilement. un polype est une protubérance des muqueuses de l'intestin qui saigne lorsque les selles s'y frottent.

Quel est le pronostic ?

Chez l'enfant, des polypes sont généralement bénins et ne reparissent habituellement pas. Certains cas requièrent plus d'une colonoscopie.

La prévention des constipations combat la réapparition de fissures et d'irritation rectale.

Si l'hémorragie est due à une colite, des médicaments sont prescrits pour traiter l'inflammation.

Pour plus d'information ou pour trouver un gastro-entérologue pédiatrique à proximité, consultez notre site Web : www.naspgghan.org

RAPPEL IMPORTANT. - L'organisation nord-américaine NASPGHAN (North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) publie cette information en tant qu'information générale et non en tant que justification définitive du diagnostic ou du traitement d'un cas donné. Il est très important que vous recherchiez l'avis de votre médecin sur votre état particulier.

LIENS:

National Digestive Disease Information Clearinghouse (NDDIC)

digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/bleeding/index.htm

Medline Plus- U.S. National Library of Medicine/NIH

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/gastrointestinalbleeding.html#cat8>

American College of Gastroenterology

www.acg.gi.org/patients/pdfs/UnderstandGIBleednew.pdf

