


Endoscopie Supérieure



Qu'est-ce qu'une endoscopie supérieure?

El doctor de su niño ha recomendado una endoscopia alta (también llamada esofagogastroduodenoscopia o EGD). Esta es una prueba en la que el doctor mira directamente dentro del esófago, estómago y parte alta del intestino delgado con un tubo flexible y delgado montado con una cámara y una

lámpara, para ayudarlo a averiguar por qué los niños tienen dolor de estómago, diarrea, vómito o problemas de crecimiento. El doctor puede tomar muy pequeñas muestras de tejido, del tamaño de una cabeza de alfiler.

Raisons pour lesquelles un enfant peut avoir besoin d'une endoscopie supérieure

Un enfant peut nécessiter une endoscopie supérieure pour plusieurs raisons, par exemple :

- ◆ des vomissements
- ◆ des problèmes de déglutition
- ◆ des problèmes de croissance
- ◆ des diarrhées
- ◆ des maux de ventre
- ◆ pour enlever des aliments, des pièces de monnaie ou d'autres objets qui causent une obstruction


INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES:

Que se passe-t-il avant et après le test ?

Avant le test, dans la matinée, votre enfant ne peut rien boire ni manger pour éviter que les boissons ou les aliments interfèrent avec le somnifère administré avant le test.

Après le test, le médecin vous montrera peut-être les photos résultantes. En même temps, il/elle peut vous dire si votre enfant doit prendre des médicaments. Une fois

qu'il est en état de boire, votre enfant peut également recommencer à manger et rentrer à la maison. Certains enfants peuvent se sentir malades après le test et doivent être surveillés pendant quelque temps.



Si votre enfant souffre des symptômes suivants après le test, appelez le médecin :

- ◆ Douleurs d'estomac qui durent plus d'une heure. La plupart des enfants se sentent en forme après le test.
- ◆ Épisodes multiples de vomissement. Pour éviter ce problème, faites boire de petites quantités de liquide à l'enfant, tel du Sprite ou du Ginger Ale, ou donnez-lui une sucette glacée.
- ◆ Hémorragie. L'enfant peut cracher de petites quantités de sang, mais ceci est un symptôme normal. Toutefois, prévenez le médecin si l'enfant crache plus d'une cuillerée de sang ou si ce symptôme dure plus d'un jour.
- ◆ Fièvre persistante.
- ◆ Maux de gorge. Votre enfant peut avoir mal à la gorge pendant un jour ou deux après le test. Contactez le médecin si la douleur est prononcée ou persistante.

Pour plus d'information ou pour trouver un gastro-entérologue pédiatrique à proximité, consultez notre site Web : www.naspgghan.org

RAPPEL IMPORTANT: L'organisation nord-américaine NASPGHAN (North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) publie cette information en tant qu'information générale et non en tant que justification définitive du diagnostic ou du traitement d'un cas donné. Il est très important que vous recherchiez l'avis de votre médecin sur votre état particulier...très important que vous recherchiez l'avis de votre médecin sur votre état particulier.

