


# Colonoscopia



## ¿Qué es una colonoscopia?

**E**l doctor de su niño ha recomendado una colonoscopia. Esta es una prueba en la que el doctor mira directamente dentro de la última parte del intestino con un tubo flexible y delgado montado con una cámara y una luz para ayudarle a averiguar

por qué los niños tienen diarrea, sangrado y dolor de estómago. El doctor puede también tomar muy pequeñas muestras de tejido, del tamaño de una cabeza de alfiler.

## Razones por las que los niños pueden necesitar una colonoscopia

Hay muchas razones por las que los niños pueden necesitar un colonoscopia, incluyendo:

- Sangre en el excremento
- Diarrea
- Dolor de barriga
- Dolor de sentaderas (trasero)

## ¿Qué pasa antes y después de la prueba?

Antes de la prueba, al niño se le da por boca medicinas para eliminar todas las heces fecales. Su niño también necesitará beber muchos líquidos claros. Es importante que durante este tiempo no coma nada. En la mañana de la prueba no se supone que su niño coma o beba nada ya que esto puede causar problemas con la medicación para dormir administrada antes de la prueba. Su enfermera o doctor le dirá cuando debe dejar de comer su niño y debe empezar con las medicinas.

Después de la prueba, su doctor puede tener fotos del intestino de su niño para mostrarle. Al mismo tiempo, puede decirle si hay alguna medicina que su niño debe tomar. Una vez que esté bebiendo líquidos sin problemas, su niño puede empezar a comer de nuevo y puede irse a casa. Algunos niños se sienten mal después de la prueba y pueden controlarse un poco más, hasta que se sientan bien.

## Después de la prueba, si su niño tiene cualquiera de estos síntomas, llame a su doctor:

- Dolor de estómago por más de una hora. La mayoría de niños se siente bien después de la prueba.
- Vómitos por varias veces. Para asegurarse que éste no es un problema, haga que el niño beba pequeñas cantidades de líquidos tales como Sprite, gingerel y paletas de hielo.
- Sangrado. Puede ser normal que elimine pequeñas cantidades de sangre (menos de una cucharada) durante 1-

2 días, pero si es más que eso o continúa, avísele a su doctor.

- Fiebre persistente.

Para más información o para localizar a un gastroenterólogo pediátrico en su área por favor visite nuestro sitio web: [www.naspghan.org](http://www.naspghan.org)

**RECORDATORIO IMPORTANTE:** Esta información es proporcionada por la Asociación Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas (NASPGHAN), como información general y no como base definitiva para diagnóstico o tratamiento en ningún caso en particular. Es sumamente importante que consulte a su médico sobre su condición específica.

## INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:

**NASPGHAN**  
NORTH AMERICAN SOCIETY FOR PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY,  
HEPATOLOGY AND NUTRITION

**APGNN**  
THE ASSOCIATION OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY  
AND NUTRITION NURSES

NASPGHAN • PO Box 6 • Flourtown, PA 19031  
215-233-0808 • Fax: 215-233-3918